

GC Initial™ LiSi Block

LITHIUM DISILIKAT GLASS CERAMIC CAD/CAM BLOCK

For use only by a dental professional in the indications for use.

GC Initial LiSi Block is lithium disilicate dental ceramic material type II, class 2.

INDICATIONS FOR USE

- Veneers
- Crowns
- Inlays
- Onlays
- Partial crowns
- Crown or split crown on top of an implant abutment

COMPOSITION

Silicon dioxide, lithium oxide, other oxides, colorant

PREPARATION DESIGN

When designing restorations, the following preparation guidelines and minimum dimensions should be maintained.

Preparation guidelines for all-ceramic restorations

- Prepare margins with deep chamfer or rounded shoulder. (Fig. 1)
- Avoid having margins in direct occlusal contact with the opposing tooth.
- Antagonist contacts must be taken into consideration.
- The incisal edge of the preparation should be at least 1.0 mm from the gingival margin in order to permit optimum milling during CAD/CAM fabrication.

- Veneers (Fig. 2)
- If possible, the preparation should be located in the enamel.
 - Reduction in the cervical and/or labial area by 0.6 mm, and the incisal edge by 0.7 mm.

- Anterior crown (Fig. 3)
- Width of the shoulder/chamfer at least 1.0 mm.
 - Reduce the incisal edge by approx. 1.5 mm.
 - Reduce the vestibular and/or oral area by approx. 1.2 mm.

- Inlay (Fig. 4)
- A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure area.
 - Do not prepare undercuts.
 - Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the long axis of the tooth.
 - All internal edges and angles should be rounded.

- Onlay (Fig. 5)
- A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure area.
 - Do not prepare undercuts.
 - Ensure the new cavity walls form an angle of 6° with the long axis of the tooth.
 - All internal edges and angles should be rounded.
 - Provide at least 1.0 mm of reduction in the cusp areas.

- Partial crown
- Provide at least 1.5 mm of reduction in the cusp area.
 - Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0 mm.

- Posterior crown (Fig. 6)
- Reduce the anatomical shape and observe the stipulation dimensions.
 - Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0 mm.
 - Reduce the incisal crown third – in the occlusal area by approx. 1.5 mm.

- CAD/CAM PROCESSING
- Please refer to respective instructions for the milling unit.
- Blocks can be processed with authorized CAD/CAM systems.

- FINISHING AND POLISHING
- Remove the finish with fine sandblasting. When necessary, adjust proximal and occlusal contacts. Initial LiSi Block can be either milled and polished or milled, glazed and polished.

- CAD/CAM OPERATIONS
- Mold outlines are sent to your system's instructions for use. Please follow the instructions for the milling unit.
- Polishing
- Finish and polish using suitable grinding instrument, low rotation speed and light pressure.
- Pay attention to margins and contact points when polishing the restoration.
- Overheating of the glass-ceramic must be avoided. Clean the restoration before cementation.

- GLAZE AND STAINING (Optional)
- For glazing, staining and micro layering, please use our dedicated GC Initial LiSi Pastes NF/ONE™. GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQUIN® for best results.

- Please follow the manufacturers' instructions for use for the materials of glazing and staining.

- For optimal results, please follow the maximum micro-layer thickness of GC Initial IQ ONE SQUIN, as per manufacturer's instructions.

- When firing, avoid heat or cool the restorations too quickly. Rapid change in temperature could break the material.
- When firing, a proper furnace tray (honeycomb tray) and support pin in combination with the GC Initial Firing Foam® should be used.

- CEMENTATION
- Restoration Etching protocol
 - Apply the etchant (5-9% for 20 seconds to the inner surfaces of the restoration.
 - Wash with water spray or an ultrasonic cleaner and dry.
 - Apply the primer (G-CEM LinfForce® or G-Multi PRIMER) and allow it to dry.
 - Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must not be applied in the oral cavity.
 - Phosphoric acid (35-37%) can be also used for the purpose of cleaning the surface, preferably scrubbing with a microbrush for 10-15 seconds.

- Cement with an adhesive resin cement (such as G-CEM LinfForce®) or a self-adhesive resin cement (such as G-CEM ONE).
- Note:
- Prior to using CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER, G-CEM LinfForce® or G-CEM ONE, refer to the respective instructions for use.
 - In case the preparation is non-retentive, an adhesive resin cement (such as G-CEM LinfForce® or G-Multi PRIMER) in combination with G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER is preferred.

- SHADE
- HT: (High Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1 LT: (Low Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1 BL: (One bleach shade)

- SIZE
- 14

- PACKAGE
- 5 blocks per box

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-77°F).

- CAUTION
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
 - Not suitable for patients with:
 - Severely reduced restorative function
 - Severely reduced occlusal vertical dimension
 - Parafuncions (e.g. suffering from bruxism)
 - Restorations should not be blasted with alumina or glass beads.
 - For use only as indicated.
 - For use only as indicated.
 - Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 - When grinding the restorations, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of dust.
 - Do not re-use. Milling partially or fully processed blocks will result in an inaccurate restoration.
 - Do not prepare less than the recommended minimum dimensions. The minimum block size should be strictly ensured after all manual adjustments have been made.

*Some products referenced in the present IVU may not be available in some regions. Please contact your local GC office for further information.

Some products referenced in the present IVU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

https://www.gc-dental/europe

They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUADMED database

(https://ec.europa.eu/tools/euadmed) or contact us at Regulatory.gcc@gc-dental

Undesired effects - Reporting

If you become aware of an undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through relevant authorities or contact your local representative of the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en, as well as to our internal vigilance system: vigilance@gcc-dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 03/2025

- Годишна употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

GC Initial™ LiSi Block

LITHIUM-DISILIKATKAT SKLOKOKERAMIKEN CAD/CAM BLOK

Da se ispoljava samo ot dentalni lekaři, spazivajuci instrukcije za upotrebu.

GC Initial LiSi Block e dentalan keramiken material ot litijev disilikat tip II, klasa 2.

POKAZANJA ZA UPOTREBA

- Vasketi
- Korune
- Umetci
- Onleji
- Čestice korune
- Korona ili širina koruna vruhu implantatna nadgradnja

ČISTAV

Silikov dioksid, litijev oksid, drugi oksidi, obojivo sredstvo

DISAJN NA PREPARACIJI

Prilikom planiranja za vraćanje stanja treba da se pridržavati svih sledećih instrukcija za pripremu i minimalni dimenzije.

Instrukcije za pripremu za vsimki vidovi keramiken vraćanje stanja

- Podgotvite granice s dubokim lubom ili krplo ramo. (Fig. 1)
- Izbegavajte granice u direktnom okluzalnom kontaktu s suprotnomlucnom zib.
- Antagonistički kontakti moraju biti uzeti pod uvažavanje.
- Trajna zubna priprema treba da bude najmanje 1,0 mm od gingivne ivice u cilju da omogućiti optimalno glodanje lijevkom CAD/CAM izrade.

- Vasketi (Fig. 2)
- Ako je moguće, priprema treba da bude na emalu.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Anteriorni kruna (Fig. 3)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 4)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 5)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

- Umetci (Fig. 6)
- Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Širina na usnama treba da bude najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.

- Onleji (Fig. 5)
- Ako je moguće, priprema treba da se osposlva dubljica na priprepanja najmanje 1,0 mm i širina na usnama najmanje 1,0 mm.
 - Nemojte postavljati podlozi.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.
 - Tr treba da se zaobliju vjokim vjtršnim rubove i uglove.
 - Uverite se, se stenice na krunici obrazuju uglom od 6° sa dužinom oso žuba.

- Posteriorni kruna (Fig. 6)
- Režnja anatomski oblik i posmatrajte dimenzije.
 - Širina na ramenu treba da bude najmanje 1,0 mm.
 - Režnja u cervikalnoj i/ili labijalnoj oblasti o 0,6 mm, a početni rubovi o 0,7 mm.

